



DRENADORES LINFÁTICOS

Una terapia clave para recuperar la piel afectada con celulitis.

La Paniculopatía Edemato-Fibro Esclerótica (P.E.F.E.) mejor conocida como "celulitis" es considerada como una enfermedad que modifica la textura de los tejidos subcutáneos superficiales. Se caracteriza por una microangiopatía de la hipodermis cuya evolución comienza con una fase edematosa, continúa con una edematofibrosa, le sigue una fibro-esclerótica y finaliza con una esclerótica que invade el tejido graso.

Estudios han demostrado que el estasis capilar-venular de los microvasos del tejido conectivo subcutáneo, son los responsables de un aumento de permeabilidad con formación de edema peridipocitario, con posterior daño celular y fibrosis.

La "Maniobra del Pliegue" es la técnica básica de palpación para el diagnóstico de celulitis, tendremos en cuenta la elasticidad cutánea, dolor, tejido flácido, estrías, nódulos, tono muscular, trastornos dérmicos, trastornos circulatorios, edema e hipotermia.

Existen factores predisponentes y desencadenantes de celulitis como sobrepeso, sedentarismo, tabaquismo, trastornos circulatorios, posturales y la herencia.

Se distinguen diversas formas clínicas, a saber:

FORMA CLÍNICA COMPACTA. Suele aparecer en mujeres jóvenes, no suele conjugarse con obesidad. Es dura, adherente en los planos profundos, no se modifica con los cambios de decúbito. La localización más frecuente es la región trocántera, cara posterior externa de muslos y cara interna de rodilla. Puede ser dolorosa a la palpación.

FORMA CLÍNICA EDEMATOSA. Se observa en mujeres de mediana edad. Es de consistencia pastosa. El compromiso suele ser difuso de toda la extremidad, dando a las piernas el aspecto de "columna". Se constatan signos de insuficiencia circulatoria, fragilidad capilar, telangiectasias, calambres, pesadez, etc. Su aspecto se modifica al cambiar de decúbito. Es dolorosa a la palpación y muchas veces de manera espontánea.

FORMA CLÍNICA MIXTA. La forma mixta puede ser variable ya que presenta características de la forma compacta y de la edematosa en diferentes proporciones. Afecta en general a mujeres mayores de 40 años. Su localización es, en especial los glúteos, cara interna de muslos, o posterior interna de los brazos. Es un tejido esponjoso y flotante que se moviliza con los cambios de decúbito. La causa es una pérdida de la elasticidad del tejido conectivo subcutáneo de la zona afectada debido a la acción de la fuerza de la gravedad. Raramente es dolorosa.

Uno de los tratamientos más efectivos consiste en un DRENAJE LINFÁTICO MANUAL. El masaje específico está dirigido a tratar la retención de líquidos, movilizar la linfa y activar la circulación, mejorando la imagen de la piel y recuperando su elasticidad. Este masaje se potencializa con la utilización de drenadores linfáticos como Lymphdiaral en crema que contiene principios activos como Conium, Colchicum y Caléndula que facilitan la movilidad de la linfa y aceleran el proceso de recuperación de la piel.

Es importante que el movimiento del masaje se realice siguiendo la dirección de la circulación, ayudando a la penetración de los principios activos afines a nuestro objetivo. Un factor clave de éxito es el masaje diario del paciente con el drenador linfático.


Esta técnica puede complementarse con mesoterapia, fisioterapia asistida, presoterapia secuencial, termosudación o hidrolipoclasia ultrasónica, indicados para tratar edemas venosos y linfáticos.

Celulitis

Piel normal



Piel con celulitis



Lymphdiaral® sensitiv Salbe N - Crema

Ideal para el manejo de celulitis, debido a que es un medicamento que estimula el drenaje linfático en desórdenes agudos y crónicos del sistema linfático

- Favorece el tratamiento de celulitis.
- Drenador linfático en edemas.
- Efecto antiinflamatorio.

10 g contienen:

Conium Dil. D2 0,40 g
Mercurius bijodatus Trit. D5 0,01 g
Stibium sulfuratatum nigrum Trit. D1 0,01 g
Caléndula T.M. 0,20 g
Echinacea Dil. D3 0,03 g

Otros componentes:

Agua depurada.
Alcohol Cetilesteárico Emulsionante.
Oleum Petrae.
Ethanol 86% en vol. de alcohol.
Oleiloleato.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a sus componentes.
Por motivos de principio no debe aplicarse en enfermedades sistémicas progresivas como tuberculosis, leucosis, colagenosis, esclerosis múltiple, enfermedad del SIDA, infección VIH y otras enfermedades autoinmunes.



Reg. San. Ecu. No.0054/ME-03-10

Lymphdiaral® Gotas Orales

Efectivo tratamiento para el drenaje linfático, que permite una rápida eliminación de sustancias tóxicas del espacio intersticial.

- Favorece la recuperación del funcionamiento celular.
- Fortalece el sistema inmunitario.
- Indicado en pacientes con alto nivel de toxicidad.

10 g (= 10,5 ml) contienen:

Taraxacum T.M. 0,8 g	Phytolacca Dil. D2 0,05 g
Caléndula T.M. 0,45 g	Hydrastis T.M. 0,1 g
Arsenicum album Dil. D8 0,1 g	Lycopodium Dil. D2 0,1 g
Chelidonium Dil. D4 0,05 g	Sanguinaria Dil. D8 0,01 g
Echinacea Dil. D3 0,03 g	

Lymphdiaral® Injektopas

Indicado en pacientes con procesos agudos.
Para administración: IV, IM y SC.

1 ampolla de 2 ml contiene:

Conium Dil. D3 - 2,5 mg
Hydrastis Dil. D3 - 2,5 mg
Phytolacca Dil D4 2,0 mg
Viscum album Dil. D2 - 2,5 mg
Scilla Dil. D1 - 2,0 mg



Reg. San. Ecu. No. 001-AMHE-04-09

Reg. San. Ecu. No. 002-AMHE-06-11



Reg. San. Ecu. No. 010-AMHE-03-11

Lymphdiaral® Tabletas

Ideal para el tratamiento de amigdalitis, faringitis e infecciones de vías respiratorias superiores.

- Respuesta inmunológica efectiva.
- Acelera la recuperación.
- Ideal para niños por su excelente tolerancia.
- Evita las recidivas.
- No tiene efectos secundarios.

1 comprimido contiene:

Srophularia nodosa T.M. 100 mg	Echinacea Trit. D3 100 mg
Mercurius bijodatus Trit. D12 100 mg	Taraxacum T.M. 0,8 g
Caléndula T.M. 0,45 g	Arsenicum album Dil. D8 0,1 g
Chelidonium Dil. D4 0,05 g	Echinacea Dil. D3 0,03 g