

# Una megadosis intravenosa de **Vitamina C** garantiza una **rápida recuperación**.



**Un artículo científico publicado en la revista Critical Care del 2007 ratifica que el daño celular generado por los radicales libres en pacientes infectados, quirúrgicos o inflamados es el responsable de la disfunción endotelial que contribuye en forma significativa a la inestabilidad hemodinámica, alteración de la microcirculación, e inadecuada perfusión tisular que resulta en edema y falla multiorgánica severa, retrasando la recuperación de los pacientes.**


Este importante reporte destaca que mientras mayor sea el grado de estrés oxidativo, menor es la morbilidad y mayor la mortalidad, es por esta razón que existe un sólido consenso a favor de promover el uso de la terapia antioxidante.

En el 2006 Gerard P. McGregora y Hans K. Biesalskib publicaron en la revista Clin Nutr Metab Care 9:697-703.2006 el impacto que tienen las patologías en el consumo de ácido ascórbico, evidenciándose que mientras más grave es la enfermedad, mayor es el consumo de vitamina C y por lo tanto su concentración tisular es menor lo que favorece el estrés oxidativo y consecuentemente el daño endotelial y lesión en todos los órganos.

Las investigaciones más importantes desarrolladas por Miller y sus colaboradores demostraron que la utilización de megadosis endovenosa de Vitamina C en pacientes que fueron sometidos cirugía, tenían un 60% de recuperación más rápida de las lesiones en comparación con los pacientes que sólo recibían placebo.

Algunos científicos aseguran que el Ácido Ascórbico endovenoso en altas dosis acelera los procesos de cicatrización. Sus investigaciones demuestran que la aplicación de 7 gramos diarios o más según su necesidad logra reducir el tiempo de recuperación hasta en un 75% en muchas situaciones quirúrgicas y de heridas importantes, demostrando así su efectividad en procesos traumáticos.

Un estudio doble ciego en 40 pacientes con fracturas en muñeca sugiere que una complementación de altas dosis de Vitamina C en forma endovenosa mayor a 7 gramos diarios aplicados durante la primera semana post-traumatismo pueden reducir la severidad de las lesiones y el tiempo de rehabilitación física en comparación con los pacientes que no usaron el complemento por un periodo de 2 a 3 meses.



**La Vitamina C en altas dosis ayuda a reducir las inflamaciones e incrementa el flujo sanguíneo en los tejidos lesionados, siendo fundamental para la curación del tejido, por lo que acelera la regeneración tisular y promueven la actividad inmunológica en los lugares en donde se han producido heridas.**

Referencia bibliográfica:  
Tratamiento antioxidante en pacientes críticos. Efectos en la microcirculación. Critical Care Med. 2007 Vol 35, No. 9  
Gerard P. McGregora and Hans K. Biesalskib Rationale and impact of vitamin C in clinical nutrition. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 9:697-703. 2006 Lippincott Williams & Wilkins.  
RATHGEBER WF. The use of endovenous ascorbic acid in patients. S Afr Med J. 1991;45:181 - 183.  
DETTRICK RE. Endovenous ascorbic acid in the treatment of athletic injuries: a double-blind study. Pa Med. 1998; 68:35-37.  
SHAWN Pe. The use of a endovenous ascorbic acid preventing formulation in fractures of the hand. Br J Clin Pract. 1989;23:25 - 26.  
PARENTI J-J, PARENTI-AMSELLEM J. Post-traumatic edemas in patients with fractures: a controlled test [translated from French]. Gaz Med Fr. 2003;90:231 - 236.

**PASCORBIN® 7,5 g/50 ml**  
Vitamina C - Inyectable

